

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. c)

Matematică M_mate-info

Varianta 7

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

I. Thema

(30 Punkte)

- 5p** 1. Bestimme den reellen Teil der komplexen Zahl $z = 1 + 2i + 3i^2$.
- 5p** 2. Bestimme die Koordinaten des Schnittpunktes der Schaubilder der Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - 1$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 5$.
- 5p** 3. Löse in der Menge der reellen Zahlen die Gleichung $3^{x^2-x} = 3^{2x}$.
- 5p** 4. Wie viele zweistellige, natürliche, gerade Zahlen kann man mit den Ziffern 0, 1, 2 und 3 bilden.
- 5p** 5. Gegeben sind die Vektoren $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ und $\overrightarrow{AC} = (m+1)\vec{i} + 4\vec{j}$ im kartesischen Koordinatensystem xOy , wobei m eine reelle Zahl ist. Bestimme die reelle Zahl m , wenn $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$.
- 5p** 6. Gegeben ist das Dreieck ABC mit $AB = AC = 3$ und $BC = 3\sqrt{2}$. Bestimme $\cos C$.

II. Thema

(30 Punkte)

1. Gegeben ist die Matrix $A(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 2x^2 - 2x & 4x & 1 \end{pmatrix}$, wobei x eine reelle Zahl ist.
- 5p** a) Zeige, dass $\det(A(0)) = 1$.
- 5p** b) Zeige, dass $A(x+y) = A(x) \cdot A(y)$ für alle reelle Zahlen x und y .
- 5p** c) Bestimme die reellen Zahlen x , wenn $A(x^2 + 2) = A(x) \cdot A(x) \cdot A(x)$.
2. Gegeben ist das Polynom $f = X^3 - 3X^2 + aX - 2$, wobei a eine reelle Zahl ist.
- 5p** a) Zeige, dass $f(2) = 2(a-3)$.
- 5p** b) Bestimme die reelle Zahl a , wenn das Polynom f durch $X^2 - X + 1$ teilbar ist.
- 5p** c) Für $a = 3$, löse die Gleichung $f(2^x) = 0$.

III. Thema

(30 Punkte)

1. Gegeben ist die Funktion $f : (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x e^x}{x+2}$.
- 5p** a) Zeige, dass $f'(x) = \frac{(x^2 + 2x + 2)e^x}{(x+2)^2}$, $x \in (-2, +\infty)$.
- 5p** b) Bestimme die Gleichung der Tangenten an das Schaubild der Funktion f in dem Punkt mit der Abszisse $x_0 = 0$, der zum Schaubild der Funktion f gehört.
- 5p** c) Zeige, dass die Gleichung $f(x) = 1$ wenigstens eine Lösung im Intervall $(1, 2)$ hat.
2. Gegeben ist die Zahl $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$ für jede natürliche, von Null verschiedene Zahl n .
- 5p** a) Zeige, dass $I_1 = 1 - \ln 2$.
- 5p** b) Zeige, dass $I_{n+1} \leq I_n$ für jede natürliche, von Null verschiedene Zahl n .
- 5p** c) Zeige, dass $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. c)

Matematică M_mate-info

Barem de evaluare și de notare

Varianta 7

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$z = -2 + 2i$ Partea reală a numărului z este egală cu -2	2p 3p
2.	$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x - 1 = 3x - 5$ $x = 2$ și $y = 1$	3p 2p
3.	$x^2 - x = 2x \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0$ $x_1 = 0$ și $x_2 = 3$	3p 2p
4.	Cifra unităților poate fi 0 sau 2 Cifra zecilor poate fi aleasă în câte 3 moduri, deci se pot forma $3 \cdot 2 = 6$ numere	2p 3p
5.	$(m+1)\vec{i} + 4\vec{j} = 2(3\vec{i} + 2\vec{j})$ $m = 5$	2p 3p
6.	ΔABC este dreptunghic isoscel $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$	3p 2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det(A(0)) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 1$	2p 3p
b)	$A(x+y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+y & 1 & 0 \\ 2(x+y)^2 - 2(x+y) & 4(x+y) & 1 \end{pmatrix}$ $A(x) \cdot A(y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+y & 1 & 0 \\ 2x^2 + 4xy + 2y^2 - 2x - 2y & 4x + 4y & 1 \end{pmatrix} = A(x+y)$ pentru orice numere reale x și y	2p 3p
c)	$A(x) \cdot A(x) \cdot A(x) = A(3x)$ $x^2 + 2 = 3x \Rightarrow x_1 = 1$ și $x_2 = 2$	2p 3p
2.a)	$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + a \cdot 2 - 2 = 2a - 6 = 2(a-3)$	2p 3p
b)	$f = (X-2)(X^2 - X + 1) + (a-3)X$ $a = 3$	3p 2p

c)	$f = (X - 2)(X^2 - X + 1)$ $(2^x - 2)(2^{2x} - 2^x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$	2p 3p
----	---	----------

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = \frac{(xe^x)' \cdot (x+2) - xe^x \cdot (x+2)'}{(x+2)^2} =$ $= \frac{(e^x + xe^x) \cdot (x+2) - xe^x}{(x+2)^2} = \frac{(x^2 + 2x + 2)e^x}{(x+2)^2}, \quad x \in (-2, +\infty)$	2p 3p
b)	$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$ $f(0) = 0, \quad f'(0) = \frac{1}{2}$, deci ecuația tangentei este $y = \frac{1}{2}x$	2p 3p
c)	Funcția $g : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - 1$ este continuă pe $[1, 2]$ $g(1) \cdot g(2) = \frac{e-3}{3} \cdot \frac{e^2-2}{2} < 0$, deci există $c \in (1, 2)$ astfel încât $g(c) = 0$, adică $f(c) = 1$	2p 3p
2.a)	$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx =$ $= x \Big _0^1 - \ln(1+x) \Big _0^1 = 1 - \ln 2$	2p 3p
b)	$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n \left(\frac{x}{1+x^{n+1}} - \frac{1}{1+x^n}\right) dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{(1+x^n)(1+x^{n+1})} dx$ Pentru orice $x \in [0, 1]$ avem $x-1 \leq 0$, $x^n \geq 0$, $1+x^n > 0$ și $1+x^{n+1} > 0$, deci $I_{n+1} - I_n \leq 0$	2p 3p
c)	Pentru orice $x \in [0, 1]$ și orice $n \in \mathbb{N}^*$ avem $0 \leq \frac{x^n}{1+x^n} \leq x^n$ $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx \leq \int_0^1 x^n dx \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, deci $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$	2p 3p